

# 博晖生物大出血急救用免疫球蛋白

## 请仔细阅读说明，请经途径医师指导使用

**警示语：**本品因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险，临床使用时应权衡利弊。

### 【商品名称】

博晖：注射用免疫球蛋白

通用名：大出血用免疫球蛋白

次注射，如所需总剂量大于10ml，可在1~2日内分

英文名：Immunoglobulin for massive bleeding

注射，随后即可进行其它常规治疗，但需和

汉语拼音：Kuanghuaiyong Renxue Mianyiqiu Danzhi

注射部位和器具要严格分开。

### 【成份】

### 【不良反应】

本品由人血浆经提纯、分离、提纯而成。

本品不良反应发生率极低，但仍有少数患者发生

辅料：蔗糖、甘油。

不良反应，由于这些不良反应/事件是在无法确定

### 【性状】

时发生的，因此不能准确估计其发生率。

本品为无色或淡黄色澄明液体，可带荧光，不应出现

任何过敏反应，无传染性，无致病性。

浑浊。

全身性反应：发热、胸部不适、乏力、畏寒、

### 【适应症】

主要用于治疗大出血或其他损伤性大出血。

过敏反应：皮疹、红斑、水肿/红晕、硬

本品为处方药，应在医生指导下使用。

皮肤及皮下组织：瘙痒、荨麻疹、荨麻疹、

### 【规格】

神经系统：头痛、头晕、

每瓶含蛋白总量为20g(120ml)

呼吸系统：咳嗽、咽痛、

### 【用法用量】

免疫系统：过敏反应、类

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的

心血管系统：面色苍白/


1/2作皮下浸润注射，余下1/2进行肌肉注射(头部咬

死、四肢发冷等。

本品可能由下列原因引起：  
寒战等  
眩晕  
皮疹  
荨麻疹

本品可能引起：  
过敏反应、过敏性休克等  
潮红、脉搏异常、心悸、血压降

本品可能引起：  
本品可能引起：  
本品可能引起：



### 【禁忌】

1. 对本品或本品任何成分有过敏史者禁用。  
 2. 有抗IgA抗体的选择性IgA缺乏者禁用。

### 【药物相互作用】

1. 本品与疫苗同时使用，可能影响疫苗效力。  
 2. 使用本品后，三个月内不得接种麻疹疫苗，因为抗体干扰疫苗免疫应答。

### 【注意事项】

1. 本品不得用作静脉注射。  
 2. 本品肌肉注射不需做过敏试验。

### 【药物过量】

本品为水溶液剂型，尽管经过筛检及灭活病毒处理，但仍含有少量蛋白质，在病毒等大颗粒物质存在时，本品可能引起过敏反应，如皮疹、荨麻疹、呼吸困难、低血压、过敏性休克等。如发生过敏反应，应立即停药，并对症治疗。

### 【药理毒理】

本品为水溶液剂型，尽管经过筛检及灭活病毒处理，但仍含有少量蛋白质，在病毒等大颗粒物质存在时，本品可能引起过敏反应，如皮疹、荨麻疹、呼吸困难、低血压、过敏性休克等。如发生过敏反应，应立即停药，并对症治疗。

### 【药代动力学】

本品为水溶液剂型，尽管经过筛检及灭活病毒处理，但仍含有少量蛋白质，在病毒等大颗粒物质存在时，本品可能引起过敏反应，如皮疹、荨麻疹、呼吸困难、低血压、过敏性休克等。如发生过敏反应，应立即停药，并对症治疗。

### 【用法用量】

本品为水溶液剂型，尽管经过筛检及灭活病毒处理，但仍含有少量蛋白质，在病毒等大颗粒物质存在时，本品可能引起过敏反应，如皮疹、荨麻疹、呼吸困难、低血压、过敏性休克等。如发生过敏反应，应立即停药，并对症治疗。

### 【包装】

本品为水溶液剂型，尽管经过筛检及灭活病毒处理，但仍含有少量蛋白质，在病毒等大颗粒物质存在时，本品可能引起过敏反应，如皮疹、荨麻疹、呼吸困难、低血压、过敏性休克等。如发生过敏反应，应立即停药，并对症治疗。

### 【有效期】

36个月

### 【执行标准】

Y55000532018

### 【批准文号】

国药准字S20190005

### 【药品上市许可持有人】

博晖生物制药(河北)有限公司

### 【生产企业】

博晖生物制药(河北)有限公司  
 生产地址：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区晋山路6号  
 邮政编码：050200  
 电话号码：0311-83935518

### 【包装】

本品为水溶液剂型，尽管经过筛检及灭活病毒处理，但仍含有少量蛋白质，在病毒等大颗粒物质存在时，本品可能引起过敏反应，如皮疹、荨麻疹、呼吸困难、低血压、过敏性休克等。如发生过敏反应，应立即停药，并对症治疗。

### 【用法用量】

本品为水溶液剂型，尽管经过筛检及灭活病毒处理，但仍含有少量蛋白质，在病毒等大颗粒物质存在时，本品可能引起过敏反应，如皮疹、荨麻疹、呼吸困难、低血压、过敏性休克等。如发生过敏反应，应立即停药，并对症治疗。

### 【有效期】

36个月